

Akkervogels geen fan van nieuw mestactieplan

Het nieuwe mestactieplan dat vanaf dit jaar in werking zou treden legt een drastische beperking op in de periode dat stalmest ten velde opgeslagen kan worden. Zo zou de tijd dat stalmest in open akkerbouwgebied opgeslagen mag worden, verkort worden van 3 maanden naar maximaal 1 maand voor onderwerken.

Dit zou het plotse einde betekenen van de – voor akkervogels zeer waardevolle – graanvelden met stalmesthoop gedurende het ganse broedseizoen. De verkorte opslagperiode betekent ook een bijkomende druk om stoppels sneller onder te werken; op deze manier worden de al steeds schaarser wordende winterse stoppelvelden ook verdreven naar het verleden. Ook de opslag op het bedrijf zal aan strakke regels onderworpen worden en de open opslag op de binnenkoer met zwaluwen en mussen erbij behoort weldra tot het verleden.

Binnen kerngebieden voor akkervogels is de aanwezigheid van stalmesthopen vooral gedurende het zomerhalfjaar bijzonder waardevol!

Tal van akkervogels gebruiken deze plaatsen als uitkijkpost maar ook als voedselgebied of locatie om te zonnen of te schuilen. Voor pas uitgevlogen jongen van alle soorten akkervogels bieden deze rommelplekjes ideaal foerageergebied. Soorten die er stevast gebruik van maken zijn grauwe gors en gele kwikstaart (zeer geschikt als uitkijkpost), maar zijn ook voor veldleeuwerik, geelgors en kneu van niet te onderschatten belang. Kuikens van kievit, fazant, patrijs en kwartel gebruiken deze plaatsen zeer graag om er te leren foerageren. Ook de juvenielen van grauwe gors, veldleeuwerik en gele kwikstaart vertoeven zeer graag op deze plaatsen.



Grauwe gors en gele kwikstaart gebruikmakend van een mesthoop. Foto's; Freek Verdonck (FV) en Remar Erens (RE).

De Werkgroep Grauwe Gors pleit voor een aanpassing van deze beperkende maatregel binnen de kerngebieden van akkervogels in Vlaanderen!

Stalmesthopen moeten op graanakkers gedurende het ganse broedseizoen aanwezig kunnen zijn in de kerngebieden van akkervogels. Zeker binnen de prioritaire kerngebieden waar een aanzienlijk deel van de resterende grauwe gorzen gedurende het broedseizoen vertoeft.

Op deze plaatsen is het landschap vaak al zo grootschalig en uitgekleeft qua akkervogel vriendelijke infrastructuur, dat het verdwijnen van deze stalmesthopen de aantrekkelijkheid van het leefgebied

gedurende het broedseizoen zeker en vast niet ten goede zal komen. Vooral op plaatsen waar alle veldwegen verhard zijn met beton en er grote perceelsoppervlaktes zijn, betekenen stalmesthopen gedurende het broedseizoen ten velde een belangrijk vervangbiotoop met veel effect op een kleine oppervlakte.

Ook de klassieke permanente rommelhoeken met naast opslag mest ook open opslag van kuilmaïs dreigen volledig opgekuist te worden. Voor grauwe gorzen zijn dit vaak en in toenemende mate uiterst belangrijke plaatsen waar vrijwel jaarrond voedsel en dekking in aanbod is.

Het tempo waarmee het anders toch wel typisch Belgisch rommelig boerenlandschap opgekuist raakt is niet meer te volgen door tal van soorten van het traditionele landbouwgebied.

Of moeten we straks ook al starten met een BO stalmesthoop op gorzenvlakje...?

(Tekst: Werkgroep Grauwe Gors - R. Guelinckx)